Esparte Vass7R05s306-310

-

Collection Vassal-Montpellier

0Mtp345

L'AST DE 30

Esparte 4 R5 s 306.310

















ANNEE 1989

NOM Esparte N EMPLACEMENT 7 85 5 306 310

Floraison Véraison début mi/v fin Débourrement Nbre Ferti-Nbre Souche yeux début mi/déb grap lité Maturité 3 4

ANNEE 1990

NOM Esparte N EMPLACEMENT 7 R 50,306,310 ..

m												
Souche	Nbre yeux		rement mi/déb	A DE	Ferti- lité	Flo début	raison mi/f			raison mi/v		Maturité
2	5 4 3	15.3	29.3 · 29.3 · 26 .3 · 26 .3 · 26 .3 · 3 · 4	4	22	25.5	28. 5 +8	31:5	23,7	30,7 +3	8.8	3.9,30 +4
Pourriture: 0 Mill.: O Port: Mile Vigueur: 3,5										3,5		

ANNEE 1991

NOM Esparte N

mi

EMPLACEMENT 7 R5 1 306.310

Souche	Nbre yeux	Débou début	rrement mi/déb	Nbre grap	Ferti- Floraison lité début mi/f fin			Véraison début mi/v fin			Maturité	
1 2					7	i, b	8-6	13.6	5,8	13.8	15.8	23.9
3 4 5	4	18.3	\$4.4 ×	1 6	Grappe: G - M - P Dim :/5 Compacité: L - M - E Pour: Mill: O Baie: TG - G - M - P Dim :/6 disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus Couleur: B-Gr-Rs-Rg-N Jus: inc - coloré Saveur: S - m - ar - fox - herb Pépins: aved - apyrène Port: 12 avec Vigueur: 3 }							
	Company of the compan											

N° d'ordre : Esfante
Désignation : 7- R5 A 306-310 (0.208)

(A) BOURGEONNEMENT

Epanoui 182 - moyen 183 - globuleux 184.

Glabre 185 - séteux 186 - velouté 187 - aranéeux 188 - duveteux 189 - cotonneux 160 - sans villosité pubescente 178 - sans villosité laineuse 279.

Blanc 167 - fauve ou roux 192 - carminé 193 - à liséré carminé 194 - jaune 195 - à plages bronzées ou cuivrées 196 - entièrement bronzé ou cuivré 197 - vert 198.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

Etalées - en gouttière - autres.

Face inférieure: glabres 199 - séteuses 200 - veloutées 201 - aranéeuses 202 - duveteuses 203 - cotonneuses 204 - sans villosité pubescente 280 - sans villosité laineuse 281.

Face supérieure : blanches 209 - fauves ou rousses 206 - carminées 207 - à liséré carminé 208 - jaune 209 - à plages bronzées ou cuivrées 210 - entièrement bronzées ou cuivrées 211 - vertes 212 - autres 213.

(Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2ème et de la 3ème feuille détachées sera notée).

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Face inférieure

Nervures: glabre 214 - séteux 215 - velouté 216 - aranéeux 217 - duveteux 218 - cotonneux 219 - sans villosité pubescente 282 - sans villosité laineuse 283.

Limbe: glabre 220 - séteux 221 - velouté 222 - aranéeux 223 - duveteux 224 - cotonneux 225 - sans villosité pubescente 284 - sans villosité laineuse 285.

A limbe plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté. Face supérieure

Blanc 226 - fauve ou roux 227 - carminé 228 - à liséré carminé 229 - jaune 230 - à plages bronzées ou cuivrées 231 - entièrement bronzées ou cuivrées 232 - verte 233.

A pétiole glabre 234 - séteux 235 - velouté 236 - aranéeux 237 - duveteux 236 - cotonneux 239 - sans villosité pubescente 286 - sans villosité laineuse 287.

Totalement - sillon - partiellement.

Calvos8

Désignation : Emplacement :

N' d'ordre :

Esparte 7 R5 s.30 6~340 (2.2)

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

A contour uni - anguleux - côtelé. Glabre 242 - à épines ou analogues 243 - poils massifs 244 séteux 245 - velouté 246 - aranéeux 267 duveteux 240 - cotonneux 241. sans villosité pubescente 288 - sans villosité laineuse 289. Entièrement - partiellement.

Mérithalle : dos coloré 248 - à raies 249 - vert 250. ventre coloré 251 - à raies 252 - vert 253.

: dos coloré 254 - à raies 255 - vert 256. Noeuds

ventre coloré 257) - à raies 258 - vert 259.

: verte 260 - jaune 261 - rouge clair 262 - rouge foncé 268. Vrille

subcontinues - intermittentes.

très courte - courte - moyenne - longue - très longue.

: coloré 264 - vert 265.

(I) FLEUR

Bouton floral : gros - moyen - petit. Morphologiquement : mâle 4 - femelle 5 - hermaphrodite 6.

Calvo 88

N° d'ordre :

Désignation : Emplacement :

Esparte 7 R5 s- 306-310 (0.1)

FEUILLE ADULTE

Petite 141 - moyenne 142 - grande 143.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre - séteux - velouté aranéeux - duveteux - cotonneux.

Face inférieure : nervures : glabre 144 - séteux 145 - velouté 146 aranéeux 147 - duveteux 148 - cotonneux 149 sans villosité pubescente 2/12 - sans villosité laineuse 273.

> limbe : glabre 150 - séteux 151 - velouté 152 aranéeux 153 - duveteux 154 - cotonneux 155 sans villosité pubescente 2/14) - sans villosité laineuse 275.

Limbe : plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté. Lobes : plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté. Surface: unie 156 - ondulée 157 - finement bullée 158 - moyenne-

ment bullée 162 - grossièrement bullée 159 - gauffrée 160 plissée au point pétiolaire 161.

Nervures : Face supérieure : verte 163 - point pétiolaire rouge 164 partiellement rouge 165 - entièrement

> Face inférieure : verte 167 - partiellement rouge 168 entièrement rouge 169.

Couleur du limbe : vert clair - vert franc - vert foncé - autre.

PETIOLE

Long 170 - moyen 171 - court 172.

Glabre 173 - séteux 174 - velouté 175 - sans villosité pubescente 276 sillon - partiellement - totalement.

Coloré 176 - partiellement coloré 177 - vert 178.

Aranéeux 179 - duveteux 180 - cotonneux 181 - sans villosité laineuse 277. partiellement - totalement.

Calvo88

N° d'ordre : Esfarte

Désignation : 7. R.5 1,306-340 (5.1)

Emplacement :

GRAPPE

Grosse 68 - Moyenne 69 - Petite 70 (dimensions 16 x).

Lâche 71 - Moyenne 72 - Compacte 73.

A pédoncule non visible 74 - visible 75 - long 76.

A pédoncule herbacé 77 - mi-aoûté 78 - aoûté jusqu'à la première ramification 79.

Axe de la rafle coloré 80 - non coloré 81.

BAIE Très grosse 82 - Grosse 83 - Moyenne 4 - Petite 85 - Très petite 86 de taille régulière irrégulière (dimensions 48 x 18). De couleur blanc 87 - gris 88 - rose 89 - rouge 90 - noir 91, Très pruinée 92 - pruinée 93 - non pruinée 94. Coloration régulière - irrégulière. Forme : discoïde 95 - sphéroïde 96 - ellipsoïde 97 - ovoïde 98 troncovoïde 99 - obovoïde 100 - cylindroïde 101 fusiforme 102 - arquée 103 - autres 104. A jus incolore 105 - coloré 106. A ombilic très apparent - peu apparent. A section transversale : régulière 107 - irrégulière 108 - côtelée 109. Région ombilicale déprimée 110 - non déprimée (11). A saveur neutre [12] - fade 113 - musquée 114 - aromatique 115 - foxée 116 herbacée 117 - spéciale 118. De séparation facile (égreneuse) - difficile. A pédicelle long 119 - moyen 120 - court 121. A pédicelle de couleur : verte 122 - rouge 123 - irrégulière 124. A bourrelet de couleur verte (25 - rouge 126 - irrégulière 127. A bourrelet évident 128 - peu apparent 129. A pinceau : court 130 - moyen [3] - long 132. A pinceau : coloré 133 - non coloré 134. A peau fine 135 - moyenne 136 - épaisse 137. A pulpe charnue 138 - juteuse 139 - molle 140 - peu juteuse. Avec pépins - apyrène.

-Calvo87

DENOMINATION : EMPLACEMENT : Esfante 7 RS D-306-3-10 1.2

SARMENT DE VIGNE

: long (1) - moyen (2) - court (3) : grêle (1) - moyen (2) - fort (3) Sarment : ramifié (1) - peu ramifié (2)) : adhérente avec lenticelles (1) - résistante se Ecorce détachant en lames (2)/.

Section transversale : circulaire (1) - elliptique (2) - aplatie (3) autre (4).

: unie (1) - anguleuse (2) - striée (3) - côtelée (4).
: pruinée (1) - partiellement pruinée (2) - non pruinée (3).
: glabre (2) - à épines ou analogues (3) - à poils
 massifs (4) - séteux (5) - velouté (6) - aranéeux (7) duveteux (8) - cotonneux (9).
: entierement (1) - partiellement (2) - sur les noeuds (3). Surface

: blanche (1) - fauve ou rousse (2) - grise (3). Villosité

: aplatis (1) - effacés (2) - globuleux (3) saillants (4). Noeuds

Mérithalle de longueur moyenne : 40 cms.

: gris (1) - jaune (2) - beige (3) - marron clair (4) - marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8).

uniforme (1) - à raies (2) - à bandes (3) - ou noeuds (4).

: plus foncé (0) - de couleur gris (1) - jaune (2) - beige (3) marron clair (4) marron foncé (5) - brun rouge (6) violacé (7) - autre (8).

: pointus en dard (1) - coniques (2) - arrondis (3). - : marron (1) - brun rouge (2) - gris (3). Yeux

Cordon pétiolaire : étroit (1) - large (2). saillant (1) - effacé (2).

: sinueux (1) - rectiligne perpendiculaire (2) rectiligne descendant (3) - rectiligne ascendant (4).

Calvo88

N° d'ordre :

```
Désignation : Esparte
Emplacement: 7 R 5 A 306-310
Angle des nervures
Sexe
                                    : (7-(8)-9
L<sub>1</sub>/L<sub>2</sub>
                                 : (10) - (11)
L2/L
                                  : (12 - (13) - (14) - 15 - 16
Nombre de lobes
                             : (17 - (18) - (19) - (20)
Prof. sinus latéral Sup.
                           : (21) - (22) - 23 - 24
Prof. sinus latéral Inf.
                           : 25 - 26 - 27 - 28 - 29
Forme sinus pétiolaire
Fond sinus pét. ni en U ni en V : 266
                                     : (267)
Sinus pétiolaire ouvert
Dent au fond du sinus pétiolaire : 30
                                     : 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39
Forme sinus latéral Sup.
Fond sinus latéral Sup. en V : (268) - en U : 269 - autre : (270)
Sinus latéral Supérieur ouvert : (271)
                                    : 40 - 41
Dents : forme
                                    : 42 - 43 - 44
Dents (angle)
Angle du lobe terminal : 45 - 46 - 47
Sinus pét. (dégar. - gar. -1/2 dégar.): 48 - 49 - 50
Nbre dents du point pét. à L3 : 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59
Angle des nervures L3 L'3 : 60 - 61 - 62
Largeur du sinus pétiolaire : 63 - 64 - 65 - 66 - 67
Dent terminale du lobe latéral supérieur
Direction: vers S.P. - droit - vers lobe terminal
Forme : à côtés rectilignes ou crochue - ogivale
Médiane/base (angle) : obtuses - moyennes - aigües
```

Remes 30